



Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығы
Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығы

ІШІМДІК ЖӘНЕ ОНЫҢ САЛДАРЫ

Әлемдегі аурулар мен мезгілсіз өлім-жітімнің 3-ші жетекші себебі

Аурулар және жарақаттармен байланысты денсаулықтың бұзылуының 200-ден аса түрінің (денсаулықтың психологиялық және мінез-құлықтық бұзылуы, оның ішінде ішімдікке тәуелділік, қауіпті инфекциялық емес аурулар, олар бауыр циррозы, обырдың кейбір түрлері және жүрек қан-тамыр аурулары, сондай-ақ зорлық-зомбылықтың және жол-көлік оқиғасының салдарынан болған жарақаттардың) қауіпті факторы



Әлемде ішімдікті шамадан тыс тұтынғанның салдарынан 3,3 миллион өлім-жітім оқиғасы орын алады, ол барлық өлім-жітім оқиғасының 5,9%-ын құрайды

Ер адамдардың арасында барлық өлім-жітім оқиғасының 7,6%-ның, ал әйел адамдардың арасында 4%-ның себебі болып табылады.

Мүгедектікке және мезгілсіз өлім-жітімге алып келеді. 20-39 жастағы адамдардың арасында барлық өлім-жітім оқиғасының 25%-ның себебі

Іштегі нәрестеде ішімдік синдромын дамытуға және де мезгіліген бұрын босануға алып келеді

ДЕНСАУЛЫҚ

ПЕН ҰЗАҚ
ӨМІРДІ
ТАҢДАҢЫЗ

WWW.HLS.KZ

Тегін таратылады